

# Medication, Allergies, and Anaphylaxis: What Every Educator Must Know Meeting Kit – Spanish



## QUÉ ESTÁ EN RIESGO

La administración de medicamentos y el manejo de alergias se encuentran entre las responsabilidades de mayor riesgo en el cuidado infantil. A diferencia de las lesiones leves, los errores en la administración de medicamentos o las reacciones alérgicas pueden agravarse rápidamente y poner en peligro la vida. Los niños dependen completamente de los adultos para prevenir la exposición a alérgenos, administrar los medicamentos correctamente y reconocer las emergencias a tiempo. Una etiqueta omitida, una instrucción poco clara o una respuesta tardía pueden tener graves consecuencias. La anafilaxia no mejora por sí sola y requiere una acción inmediata. La diferencia entre un susto y una tragedia suele reducirse a la preparación, la atención y la confianza.

## CUÁL ES EL PELIGRO

Los incidentes relacionados con medicamentos y alergias suelen ocurrir durante las rutinas normales y ajetreadas, cuando la atención está dividida. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. informan que las alergias alimentarias afectan a aproximadamente 1 de cada 13 niños, lo que significa que la mayoría de las aulas de guarderías incluyen al menos un niño con riesgo de sufrir una reacción grave.

Los errores en la administración de medicamentos también son más probables durante la administración, especialmente cuando varios niños reciben medicamentos al mismo tiempo o cuando el personal se siente apurado. Las agencias de salud pública canadienses informan de patrones similares, y la anafilaxia sigue siendo una de las principales causas de visitas de emergencia relacionadas con alergias entre los niños pequeños.

Cuando la información es incompleta, los procedimientos varían o el personal duda durante las emergencias, una situación manejable puede agravarse rápidamente.

### Puntos Comunes de Fallo

**Lagunas de Información:** La falta de detalles sobre las alergias, los formularios médicos obsoletos o las instrucciones poco claras aumentan la posibilidad de cometer

errores.

**Complacencia:** la familiaridad con la afección de un niño puede llevar a hacer suposiciones. Pensar «nunca han tenido una reacción antes» no es una protección.

**Distracción Durante los Momentos de Mucho Trabajo:** las aulas activas aumentan el riesgo de administrar el medicamento equivocado, la dosis equivocada, al niño equivocado o en el momento equivocado.

**Respuesta Tardía:** la anafilaxia puede empeorar rápidamente. Esperar a ver si los síntomas mejoran en lugar de actuar de inmediato puede convertir una situación límite en una emergencia médica.

## COMO PROTEGERSE

La seguridad de los medicamentos y las alergias depende de la constancia, la atención y la rapidez a la hora de actuar cuando algo no va bien. Los pequeños pasos que se dan cada día previenen emergencias graves.

### Administre los Medicamentos con Cuidado

La administración segura de medicamentos comienza con la verificación. Tómese su tiempo y confirme siempre las cinco reglas: el niño correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, el momento correcto y el método correcto. Lea las etiquetas de los medicamentos cada vez que administre una dosis, incluso si ya lo ha hecho antes. Si las instrucciones no están claras o algo no coincide con el plan de cuidados del niño, deténgase y aclárelo antes de continuar. Los medicamentos deben almacenarse siempre de forma segura, fuera del alcance de los niños, y manipularse de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento. La documentación debe realizarse inmediatamente después de la administración para evitar dosis omitidas o duplicadas.

### Reconozca los Síntomas de Alergia y Anafilaxia

Las reacciones alérgicas pueden progresar rápidamente, por lo que es importante reconocerlas a tiempo. Los síntomas pueden incluir hinchazón de la cara o la garganta, urticaria, dificultad para respirar, vómitos, mareos o cambios repentinos de comportamiento. Cuando aparezcan varios síntomas a la vez, trate la situación con seriedad. La anafilaxia es una emergencia médica y requiere una acción inmediata.

### Reaccione Rápidamente Durante una Emergencia Alérgica

- Administre epinefrina de acuerdo con el plan de cuidados del niño y la formación recibida.
- Llame inmediatamente a los servicios de emergencia.
- Vigile al niño continuamente y quédese con él.
- Siga los procedimientos de emergencia y documente el incidente después.

### Prevenga la Exposición Durante las Rutinas Diarias

- Sepa qué niños tienen alergias y revise sus planes de emergencia.
- Evite compartir alimentos y esté atento a la contaminación cruzada.
- Limpie bien las mesas, los utensilios y las superficies después de las comidas.
- Comuníquese claramente con sus compañeros de trabajo y las familias sobre las precauciones que deben tomarse con respecto a las alergias.

Las rutinas constantes, los controles cuidadosos y la acción rápida son lo que evita que los medicamentos y los riesgos de alergia se conviertan en emergencias médicas.

## **CONCLUSIÓN**

La seguridad de los medicamentos y el manejo de las alergias requieren precisión, atención y confianza. Cuando los sistemas son claros y el personal está preparado, los riesgos disminuyen y los resultados mejoran. En situaciones de emergencia, la indecisión es el enemigo. La preparación salva vidas.

---