


Safety in Agriculture Infographic – Spanish



EN LA AGRICULTURA...

Prevención de riesgos biológicos

Siembra y manipulación de la tierra

Enfermedad / agente biológico	Vía de entrada	Prevención	
• Carbunclo / Bacteria: <i>Bacillus anthracis</i>	Respiratoria, digestiva, parenteral	Vacunación de animales susceptibles. Evitar la exposición de heridas abiertas.	
• Histoplasmosis / Hongo: <i>Histoplasma capsulatum</i>	Respiratoria	Evitar el anidamiento o asentamiento de aves o murciélagos en las explotaciones agrícolas.	
• Toxocariasis / Parásito: <i>Toxocara spp</i>	Digestiva	Control de vectores, desinsectación. Manipulación y eliminación adecuada de excrementos animales que pudieran aparecer en la explotación agrícola.	
• Toxoplasmosis / Parásito: <i>Toxoplasma gondii</i>	Digestiva		
• Tétanos / Bacteria: <i>Clostridium tetani</i>	Parenteral	Vacunación, dosis completa según indicaciones de Ministerio de Sanidad. Limpieza y desinfección de la herida. Uso de guantes de protección.	

Abonado

Enfermedad / agente biológico	Vía de entrada	Prevención	
• Ascariasis / Parásito: <i>Ascaris lumbricoides</i>	Digestiva	Emplear abonos y enmiendas orgánicas debidamente tratados. Buenas prácticas de higiene: aseo personal, no comer, beber o fumar sin haberse lavado las manos. Utilizar ropa de trabajo y EPI adecuado.	
• Cisticercosis / Parásito: <i>Toxenia solium</i> (adulto) <i>Cysticercus cellulosae</i> (larva)	Digestiva		

Riego

Enfermedad / agente biológico	Vía de entrada	Prevención	
• Leptospirosis / Bacteria: <i>Leptospira interrogans</i>	Dérmica, parenteral	Buenas prácticas de higiene. Uso de EPI: guantes y botas. Control de roedores. Utilización profiláctica de doxiciclina en zonas de alto riesgo.	
• Hepatitis A / Virus: <i>Virus de la hepatitis A</i>	Digestiva	Vacunación. Evitar el contacto directo con heces de personas o animales infectados. Manipulación y eliminación adecuada de residuos. No utilizar para el riego aguas que no estén debidamente tratadas. No beber agua que no sea potable. Buenas prácticas de higiene: aseo personal, no comer, beber o fumar sin haberse lavado las manos.	

Recolección, transporte y almacenamiento

Enfermedad / agente biológico	Vía de entrada	Prevención	
• Aspergilosis / Hongo: <i>Aspergillus spp.</i>	Respiratoria		
• Blastomicosis / Hongo: <i>Blastomycetes dermatitidis</i>	Respiratoria	Ventilación adecuada en los lugares de trabajo, evitar la humedad relativa alta. Programa periódico de limpieza y mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, especialmente del sistema de climatización. Evitar la generación de polvo y bioaerosoles.	
• Criptococosis / Hongo: <i>Cryptococcus neoformans</i>	Respiratoria		
• Asma profesional, síndrome tóxico por polvo orgánico, bronquitis crónica, neumonitis alérgica / Productos derivados de seres vivos	Respiratoria	Evitar la exposición del trabajador sensibilizado al alérgeno (cambio puesto trabajo). Uso de EPI: mascarillas.	
• Dermatitis / Seres vivos o productos derivados	Dérmica	Uso de EPI: guantes hasta el antebrazo. Limpieza y desinfección de heridas. Evitar la exposición del trabajador sensibilizado al alérgeno (disminuir tiempo de exposición, cambio de puesto de trabajo).	
• Enfermedad de Lyme / Bacteria: <i>Borrelia burgdorferi</i>	Parenteral	Uso de ropa clara (para identificar fácilmente a la garrapata) que cubra las zonas del cuerpo en contacto con la vegetación. Pantalón largo metido por dentro del calcetín. Repelentes en la ropa o piel. Inspeccionar la piel tras el trabajo. Si se detecta la garrapata adherida a la piel, se debe extraer lo antes posible.	

Fuente: <https://www.insst.es>